

بسمه تعالی

اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه
آزمون دوره چهارم (آذر 88)

1. چه اطلاعاتی توسط EMT-B در مورد بیمار جمع آوری می شود؟

- الف: سرعت و کار تنفسی ب: فشار خون سیستنولیک برای بیماران کوچکتر از سه سال
ج: بازگشت مویرگی برای بیماران کوچکتر از 6 سال د: الف و ج

2. کدامیک از موارد زیر در تصحیح اشتباهات فرم PCR نادرست می باشد؟

- الف: اشتباه را نباید پاک نمود. ب: نباید مجدداً روی اشتباه نوشت.
ج: در تصحیح اشتباه ، نیازی به پاراف نیست. د: همه موارد صحیح می باشد.

3. روش CHART شامل چه مواردی است؟

- الف: شکایت اصلی بیمار ب: شرح حال بیمار
ج: تجویز درمان ارائه شده به بیمار د: همه موارد

4. در تجویز داروهای زیر زبانی، چک کدامیک از موارد زیر اهمیت بیشتری دارد؟

- الف: هوشیاری ب: سن بیمار ج: نبض د: فشار خون

5. کدامیک از داروهای زیر در بیماران مبتلا به تنفس مشکل به همراه بیماریهای تنفسی تجویز نمی شود؟

- الف: آلبوترونول ب: متاپروترنول ج: اپی نفرین د: ایپراتروپیوم

6. در بیماری که درد قفسه سینه دارد و حمله حاد قلبی برای وی مطرح است، چه دارویی تجویز می شود؟

- الف: ایزوواتادین ب: متاپروترنول ج: سالمترول د: آسپرین

7. کدامیک از موارد زیر در مورد شارکول فعلی شده نادرست می باشد؟

- الف: شارکول فعلی شده یک سوسپانسیون می باشد.
ب: از تکان دادن آن باید خود داری کرد.

ج: در اورژانس های مسمومیت مورد استفاده قرار می گیرد.

د: در اورژانس های مصرف بیش از حد دارو مورد استفاده قرار می گیرد.

8. موارد منع مصرف داروی نیترو گلیسیرین کدام است؟

الف: فشار خون بالا ب: برادي پنه ج: فشار خون پایین
د: تاکی پنه

9. نحوه تجویز نیتروگلیسیرین چگونه است؟

الف: تنها در یک دوز تجویز می شود.
در صورت عدم بهبودی حد اکثر 2 دوز تجویز می شود.
ج: فوacial تجویز مجدد دارو هر دو دقیقه است.
صورت عدم بهبودی حد اکثر 3 دوز تجویز می شود.

10. نیترو گلیسیرین چه اثراتی را به همراه دارد؟

الف: شل نمودن عروق خونی ب: کاهش بار قلب
ج: انقباض عروق خونی د: الف و ب

11. اثر جانبی نامطلوب اپی نفرین کدام است؟

الف: هیپو تانسیون ب: تاکی کارדי ج: برادي کاردي
د: سرد درد

12. هیپو تانسیون، سرد درد و تغییرات سرعت ضربان از عوارض جانبی کدام دارو می باشد؟

الف: اپی نفرین ب: آسپرین ج: نیترو گلیسیرین د: گلوكز خوراکی

13. پس از تجویز دارو، چه مواردی باید مجدد ارزیابی شود؟

الف: سرعت و چگونگی تنفس، ضربان و پوست ب: فشار خون
ج: اثرات جانبی دارو د: همه موارد

14. چه شرایطی رسپتور های ریه را تحریک کرده و منجر به ناکافی بودن تنفس می شود؟

الف: آسم ب: پنومونی ج: نارسایی احتقانی قلب د: همه موارد

15. اولویت شما در درمان بیمار مبتلا به دیسترس تنفسی به ترتیب کدام است؟

الف: برقراری یک راه هوایی باز، تنفس کافی، ونتیلاسیون با فشار مثبت، تجویز اکسیژن

ب: تنفس کافی، برقراری یک راه هوایی باز، تجویز اکسیژن، ونتیلاسیون با فشار مثبت

ج: تنفس کافی، برقراری یک راه هوایی باز، ونتیلاسیون با فشار مثبت، تجویز اکسیژن

د: تنفس کافی، ونتیلاسیون با فشار مثبت، برقراری یک راه هوایی باز، تجویز اکسیژن

16. کدام یک از حالت‌های زیر در بیمار مبتلا به دیسترس تنفسی نیاز به مداخله فوری دارد؟

الف: حالت سه پایه ب: حالت طاق باز به دنبال خستگی
ناشی از دیسترس تنفسی

ج: آشفتگی و گیجی د: الف و ج

17. نشانه زودرس اکسیژن رسانی ناکافی مغز کدام است؟

الف: سیانوز ب: رنگ پریدگی ج: تغییر وضعیت هوشیاری د:
تعزیر

18. علامت نارسایی تنفسی قریب الوقوع کدام است؟

الف: سستی پلک ها ب: حرکت سر در هر تنفس ج: به خواب رفتن در حالت
نشسته د: همه موارد

19. اگر سرعت و حجم جاری بیمار کافی است، چه مراقبتی را ارائه میدهید؟

الف: تجویز اکسیژن به میزان 6-1 لیتر در دقیقه از طریق ماسک یک طرفه

ب: تجویز اکسیژن به میزان 15 لیتر در دقیقه از طریق ماسک یک طرفه

ج: تجویز اکسیژن به میزان 6-1 لیتر در دقیقه از طریق کانولای بینی

د: تجویز اکسیژن به میزان 6-1 لیتر در دقیقه از طریق کانولای بینی

20. علائم دیسترس تنفسی و هیپوکسی کدام است؟

الف: تاکی کاردي، پوست سرد و رنگ پریده ب: برادي کاردي، پوست
خشک و سرد

ج: تاکی کاردي، پوست خشک و رنگ پریده د: برادي کاردي، پوست
سرد و مرطوب

21. علامت شوم و دیررس دیسترس تنفسی کدام است؟

الف: سیانوز ب: سرعت تنفسی خیلی کم ج: حرکت پره های بینی
د: الف و ب

22. عوارض جانبی بالقوه برونکودیلاتورها کدام است؟

الف: تغییر حس چشایی ب: تاکیکاردي ج: افزایش ویز
د: برادي کاردي

23. کدام یک از موارد زیر در مورد آمفیزم نادرست می باشد؟

الف: ناشی از ترومما به گردن و قفسه سینه می باشد. ب: نشان دهنده
سوراخ در ریه، تراشه، برونش و یا مري

ج: سمع ویز د: همه موارد بالا صحیح می باشد.

24. برادی کارדי در بیماران نشان دهنده کدام یک از موارد زیر است؟

الف: اکسیژن گیری بسیار ضعیف ب: نارساپی تنفسی قریب
الوقوع

ج: ایست قلبی احتمالی د: همه موارد

25. علامت جدی ترومای قفسه سینه که می تواند منجر به ونتیلاسیون غیر موثر شود، کدام است؟

الف: الگوی تنفسی نامنظم ب: وضعیت سه پایه ج: حرکت معکوس
د: سیانوز

26. در چه مواردی برونکو دیلاتور به وسیله MID نباید داده شود؟

الف: هوشیاری ناکافی جهت استفاده از MID

ب: عدم تجویز MID برای بیمار

ج: بیمار قبل از رسیدن نیروهای اورژانس، ماسکسیم دوز مجاز را مصرف کرده باشد.

د: همه موارد

27. تنفس ناله گون در کودکان و شیرخواران نشان دهنده چه مشکلاتی است؟

الف: تلاش بیش از حد در هنگام دم ب: دیسترس تنفسی شدید

ج: بیماریهای ایجاد کننده کلابس ریه د: برادی کاردي

28. در کدام یک از موارد زیر کراکل شنیده می شود؟

الف: ادم ریه و پنومونی ب: آسم و آمفیزم

ج: برونژیت مزمن و پنومونی د: آسم و ادم ریه

29. کدام یک از موارد زیر در مورد حمله پایدار آسم نادرست می باشد؟

الف: به اکسیژن پاسخ می دهد. ب: به دارو پاسخ می دهد.

ج: یک حمله طولانی و تهدید کننده حیات است. د: سبب ایجاد تنفس ناکافی می شود.

30. علائم و نشانه های آسم کدام است؟

الف: دیس پنه، برادی کاردي، $SPO_2 < 95\%$

ب: تاکی کاردي، تاکی پنه، ضربان قلب > 110 تا در دقیقه و با سرعت بالا

ج: تاکی کاردي، تاکی پنه ، $SPO_2 > 95\%$

د: برادی کاردي، برادی پنه، ضربان قلب < 110 تا در دقیقه و با سرعت آهسته

31. در بیمارستان به حمله پایدار آسم چه مراقبتی را در زمان انتقال وی ارائه می دهید؟

الف: ونتیلاسیون ب: تجویز اکسیژن مرتبط

ج: انتقال در وضعیت نیمه نشسته د: همه موارد

32. احتمال ابتلا به آمبولی ریوی در چه افرادی بیشتر است؟

الف: شکستگی استخوان های بلند ب: استروژن درمانی

ج: ترومبوуз وریدهای عمقی د: همه موارد

33. سه علامت شایع آمبولی ریوی کدام است؟

الف: درد قفسه سینه، دیس پنه، برادی پنه ب: درد قفسه سینه، تاکی پنه، هیپوتانسیون

ج: درد قفسه سینه، دیس پنه، تاکی پنه د: درد قفسه سینه، تاکی پنه، هیپرتانسیون

34. مراقبت اورژانسی در ادم حاد ریوی چیست؟

الف: ونتیلاسیون با فشار مثبت بدون اکسیژن تكميلي

ب: در صورت تنفس کافی، اکسیژن با ماسک یک طرفه به میزان 15 لیتر در دقیقه

ج: انتقال بیمار در وضعیت نیمه نشسته

د: همه موارد

35. یافته کلیدی در پنوموتوراکس خود به خودی کدام است؟

الف: ادم اندام تحتانی ب: اتساع وریدهای گردانی

ج: کاهش صدای تنفسی بدون هیچ ترمایی به قفسه سینه د: درد ناگهانی و تیز قفسه سینه و یا شانه

36. شایع ترین علائم و نشانه های سندروم حاد کرونر کدام است؟

الف: تعریق ناگهانی ب: پوست گرم و کم رنگ ج: نبض غیر طبیعی اما منظم د: برادی کاردی

37. کدام یک از موارد زیر از مراقبت های اورژانسی سندروم حاد کرونر است؟

الف: اکسیژن به میزان 10 میلی لیتر در دقیقه توسط کانولای بینی

ب: تجویز 325 - 160 میلی گرم آسپیرین

ج: انتقال بیمار در وضعیت خوابیده

د: همه موارد

38. آنژین ناپایدار چه ویژگی هایی دارد؟

الف: طولانی و بدتر شونده است. ب: در حین فعالیت رخ می دهد.

ج: در حین استراحت رخ می دهد. د: الف و ج

39. کدام یک از موارد زیر نادرست می باشد؟

- الف: آنژین صدری نشانه دریافت ناکافی اکسیژن توسط عضله قلب یا میوکارد است.
ب: درد در زیر جناغ احساس شده و به فک، دست ها، پشت و اپیگاستر انتشار می یابد.

ج: درد اغلب حدود 30 - 15 دقیقه به طول می انجامد.

د: پس از استراحت و مصرف نیتروگلیسیرین، علائم به سرعت بهبود می یابد.

40. حداقل سرعت ونتیلاسیون با فشار مثبت به همراه اکسیژن تكمیلی در بالغین و شیرخواران به ترتیب چند تنفس در دقیقه است؟

الف: 20 - 20 ب: 25 - 25 ج: 35 - 20 د: 45 - 20

41. در چه مواردی باید از تجویز نیتروگلیسیرین خودداری نمود؟

الف: فشار خون سیستولیک کمتر از 90 mmhg

ب: در بیماران مشکوک به آسیب سر

ج: بیمار در لحظه ورود تیم اورژانس 3 دوز را مصرف کرده باشد.

د: همه موارد

42. کدام یک از موارد زیر نادرست می باشد؟

الف: افراد دیابتیک و بیماران سالخورده علائم و نشانه های تیپیک آنژین را ندارند.

ب: آنژین کلاسیک فقط با تجویز نیتروگلیسیرین تخفیف می یابد و استراحت اثری بر بیمار نخواهد گذاشت.

ج: آنژین شبانه یک سندروم کرونری حاد اورژانسی می باشد.

د: آنژین ناپایدار ممکن است در حین استراحت نیز رخ دهد.

43. در صورتی که بیمار مشکوک به انسداد شریان کرونری است چه دارویی و با چه دوزی برای او تجویز می کنید؟

الف: نیتروگلیسیرین 2 دوز ب: نیتزوجلیسیرین 3 دوز

ج: آسپیرین 325 - 165 میلی گرم د: آسپیرین

44. علائم و نشانه های انفارکتوس میوکارد کدام است؟

الف: رنگ پریدگی یا پوست خاکستری ب: احساس سبکی در سر

ج: تهوع و ضعف د: همه موارد

45. شایعترین دیس ریتمی که بیمار در ابتدای ایست قلبی با آن مواجه می شود، کدام است؟

الف: فیبریلاسیون بطنی ب: فیبریلاسیون دهلیزی

ج : آسیستول د : تاکی کاردی

46. مهمترین نشانه حمله قلبی کدام است؟

الف: تعریق ب: تهوع و استفراغ ج: ناراحتی قفسه سینه
د: گیجی و بی حالی

47. علت نارسایی قلب راست کدام است؟

COPD الف: نارسایی بطن چپ ب: هیپرتانسیون ج:
د: همه موارد

48. کدام یک از موارد زیر در مورد نارسایی احتقانی قلب نادرست می باشد؟

الف: ناشی از نارسا شدن پمپاژ قلب می باشد. ب: منجر به ادم ریوی و ادم
سایر نقاط بدن می شود.

ج: ادم فقط در پاهای ایجاد می شود. د: شکم متسع و اسفنجی نرم
خواهد بود.

49. علامت دیررس نارسایی احتقانی قلب کدام است؟

الف: دیس پنه شدید ب: اتساع وریدهای گردنی و ورید
ژوگولار

ج: ارتوپنه د: دیافورز

50. سرفه به همراه خلط صورتی رنگ در کدام یک از بیماریهای زیر مشاهده می شود؟

الف: آئزین صدری ب: MI د:
COPD ج: نارسایی احتقانی قلب

پاسخنامه

اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه (دوره چهارم)

| سوال | الف | ب | ج | د |
|------|-----|---|---|---|
| 26 | | | | * |
| 27 | | * | | |
| 28 | * | | | |
| 29 | * | | | |
| 30 | * | | | |
| 31 | | | | * |
| 32 | | | | * |
| 33 | * | | | |
| 34 | * | | | |
| 35 | * | | | |
| 36 | * | | | |
| 37 | * | | | |
| 38 | | | | * |
| 39 | * | | | |
| 40 | * | | | |
| 41 | | | | * |
| 42 | * | | | |
| 43 | * | | | |
| 44 | | | | * |
| 1 | | | | * |
| 2 | * | | | |
| 3 | | | | * |
| 4 | | * | | |
| 5 | * | | | |
| 6 | | | | * |
| 7 | | * | | |
| 8 | * | | | |
| 9 | | | | * |
| 10 | | | | * |
| 11 | | * | | |
| 12 | * | | | |
| 13 | | | | * |
| 14 | | | | * |
| 15 | | | * | |
| 16 | | * | | |
| 17 | * | | | |
| 18 | | | * | |
| 19 | | * | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| | | | * | 45 | | | | * | 20 |
| | * | | | 46 | * | | | | 21 |
| * | | | | 47 | | | * | | 22 |
| | * | | | 48 | | * | | | 23 |
| | | * | | 49 | * | | | | 24 |
| | * | | | 50 | | * | | | 25 |